

## **INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE DE CLENPIQ**

Deberá beber la solución laxante Clenpiq para limpiar su colon. Debe completar toda la preparación para garantizar la limpieza más efectiva. Compre un kit de Clenpiq de su farmacéutico utilizando la receta adjunta. ¡Retire su receta de Clenpig una semana antes de su procedimiento! Las alternativas menos costosas están disponibles con receta, pero requieren beber más volumen y deben solicitarse antes o en el momento de recoger la receta.

**DEBE NOTIFICAR A NUESTRA OFICINA DENTRO DE LAS 72 HORAS DE LA CITA SI SE REQUIERE UNA AUTORIZACIÓN PREVIA O UNA NOTIFICACIÓN. DEBE NOTIFICAR A NUESTRA OFICINA DENTRO DE LAS 72 HORAS SI NECESITA CANCELAR SU PROCEDIMIENTO PARA EVITAR QUE SE LE COBRE UN POSIBLE CARGO DE CANCELACIÓN DE \$100.00.**

Un día antes de su colonoscopia: No alimentos sólidos - Líquidos claros SOLAMENTE durante el día. ¡NADA ROJO NI MORADO! NO frutas, verduras, galletas, galletas saladas, lácteos o líquidos concentrados congelados.

Lista de dieta de líquidos claros:

Refrescos, jugos de frutas colados (jugo de manzana, arándano blanco, jugo de uva blanca), Kool-Aid, Gatorade, Ginger Ale, café, té, agua, caldo/consomé de pollo o res, gelatina sin fruta ni cobertura añadida, caramelos duros ( ejemplo: Jolly Ranchers), paletas heladas (sin sorbetes ni barras de frutas). ¡NO CREMAS DE LECHE, NI LÁCTEOS, NI BEBIDAS ALCOHÓLICAS! ¡NADA ROJO NI MORADO!

La noche antes de su colonoscopia, a las 5:00 p. m. (primera dosis):

**Paso 1:** Tome las primeras dosis (1 botella) de CLENPIQ (NO REFRIGERAR NI AGREGAR HIELO) en la tarde o temprano en la noche antes de la colonoscopia (p. ej., de 4:00 p. m. a 6:00 p. m.).

**Paso 2:** Después de la dosis de CLENPIQ, beba cinco vasos de 8 onzas (el vaso incluido) de líquidos claros (40 onzas en total) dentro de las 5 horas y antes de la próxima dosis.

**2da dosis:** aproximadamente 6 horas más tarde en la noche anterior a la colonoscopia (p. ej., de 10:00 p. m. a 12:00 a. m.

**Paso 3:** Tome la segunda dosis (el segundo frasco) de CLENPIQ. (NO REFRIGERAR NI AÑADIR HIELO).

**Etapa 4;** Después de la dosis de CLENPIQ, beba POR LO MENOS tres vasos de 8 onzas (vaso provisto) (24 onzas) de líquidos claros dentro de las 5 horas y antes de acostarse.

**DESPUÉS DE COMPLETAR LA PREPARACIÓN NO COMA NI BEBA NADA HASTA DESPUÉS DE SU PROCEDIMIENTO!!!!**

More about this source textSource text required for additional translation information

Send feedback

Side panels